

79^{ème} Congrès

SNFMI

5 au 7

JUIN 2019

**LE CORUM, PALAIS DES CONGRÈS
MONTPELLIER FRANCE**

www.snfmi2019.fr

Présidents :

Pr. Pierre FESLER
Pr. Philippe GUILPAIN
Pr. Alain LE QUELLEC
Pr. Jean RIBSTEIN





Qualité de vie et uvéites : données de l'étude ULISSE (Uvéites : évaluation clinique et médico-économique d'une Stratégie Standardisée pour le diagnostic Etiologique)

Pierre Jean Bertrand, Yvan Jamilloux, Laurent Kodjikian, Marie-Hélène Errera, Laurent Pérard, Grégory Pugnet, Nathalie Tieulie, Marc Andre, Philip Bielefeld, Alain M. Bron, Pascale Guerre, Pascal Sève and the ULISSE group



Déclaration d'intérêts

- Aucun conflit en rapport avec la thématique



Introduction

- Uvéites susceptibles d'altérer la qualité de vie
- Impact mesuré dans plusieurs études
- Lien avec dépression
- Des résultats hétérogènes

Maca SM, *et al. Br J Ophthalmol* 2013



Objectif

- Etudier en prospectif la qualité de vie des patients de l'étude ULISSE



Méthodes

- ULISSE : évaluation prospective d'une stratégie diagnostique standardisée au cours des uvéites
- Inclusion : diagnostic uvéite inaugural
- Exclusion : diagnostic ophtalmologique seul, pathologie déjà connue, nécessité de traitement urgent
- 913 patients entre 2010 et 2013
- 23 centres



Méthodes

- 2 questionnaires à M0 et M6
 - VFQ-25 : qualité de vie ophtalmologique
 - SF-36 : qualité de vie générale
- Données démographiques + caractéristiques de l'uvéite



Résultats VFQ-25

- 466 répondeurs au questionnaire à M0
- Age médian 44 ans, 55% sexe féminin
- Uvéites antérieures (69%), pan-uvéites (13,5%), uvéites postérieures (12,3%) et uvéites intermédiaires (11,9%)
- Uvéite sévère 1,3%



Résultats

Variable	Modalités	Inclusion
santé générale	n	463
	moy(std)	55.13 (21.68)
Vision générale	n	462
	moy(std)	65.28 (20.53)
Douleur oculaire	n	464
	moy(std)	66.06 (26.65)
Score composite	n	466
	moy(std)	80.03 (16.75)



Résultats

- Analyse multivariée :
 - Sexe féminin ($p < 0,001$)
 - Age plus élevé ($p < 0,001$)
 - Pan-uvéite ($p < 0,001$)
- Paramètre négatifs : latéralité, mode et durée d'évolution, baisse d'acuité visuelle sévère



Résultats VFQ à 6 mois

- 138 répondeurs au questionnaire
- Pas de différence significative vs non répondeurs au questionnaire
- Amélioration significative du score composite moyen (82,6 vs 78,7 $p=0,0002$)
- Aucun facteur associé de façon significative à l'évolution du score composite
- Y compris existence d'un diagnostic étiologique



Résultats SF-36


- 425 réponses à M0, 125 à M6

Variable	Modalités	Inclusion
Score résumé physique	n	425
	moy(std)	47.16 (8.49)
Score résumé mental	n	425
	moy(std)	42.92 (11.28)



Résultats SF-36

- Amélioration significative composante mentale



M0 — M6 ---



Discussion

- Qualité de vie relativement préservée
- Mais possiblement moindre qu'en population générale
- Déterminants moindre qualité de vie :
 - Sexe féminin, âge
 - Pan-uvéite
 - Absence d'impact baisse d'acuité visuelle sévère
 - Présence d'un diagnostic

Fabiani C *et al.* *Isr Med Assoc J* 2017



Conclusion

- Grande cohorte de patients français
- Un outil pour le clinicien